

# Fungatinex

Dr. Michaels Krém

## Fungatinex Dr. Michaels Krém

příbalová informace zdravotnického prostředku



### Co byste měli vědět o zdravotnickém prostředku FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM

Tento příbalový leták informuje uživatele o přínosech a možných rizicích při užívání zdravotnického prostředku FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM. Uschovejte tento letáček spolu s obalem k pozdějšímu nahlédnutí. Vždy pozorně čtete informace pro použití a vezměte na vědomí všechna upozornění. Používejte FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM jen do uplynutí vyznačené doby použitelnosti nebo data spotřeby. Prostředky nikdy nefeďte, ani je nemíchejte s jinými produkty. Prostředek nanášejte vždy pouze čistýma rukama nebo aplikátorem, který je pravidelně pečlivě umyt mýdlem nebo jemným čistícím prostředkem. Jestliže k nanášení prostředku používáte aplikátory, ujistěte se, že budou vždy po použití umyty a nechte je vždy před dalším použitím úplně vysušit. Zdravotnický prostředek s nikým jiným nesdílejte.

### K čemu se zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM používá?

Přípravek FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ poskytuje pokožce úlevu při problémech s plísňovými infekcemi. Pomáhá optimalizovat kožní bariéru a mikrobiální rovnováhu. Kombinace esenciálních olejů a výtažků z bylin má antimykotické a antibakteriální vlastnosti a poskytuje úlevu při svědění a podráždění. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít oba produkty, protože se vzájemně doplňují.

### Použití zdravotnického prostředku

Zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM spolu s FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ se aplikují ve dvou krocích. Doporučujeme je použít jednou denně.

Přípravek FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ je speciálně vyvinutý, aby připravil pokožku pro aplikaci FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM tím, že ji jemně odmastí a vyčistí. Následně aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM. Nanášejte přímo na postižená místa plísňovou infekcí. Krém aplikujte vždy jemným vmasírováním do pokožky a nechte volně vstřebat.

### Než začnete zdravotnický prostředek používat

Než začnete používat zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM, VŽDY před použitím nejdříve vyzkoušejte malé množství produktu na malé ploše pokožky, jako test na možné reakce, obzvláště budete-li produkt používat na citlivých místech pokožky. Ponechte na pokožce působit 24-48 hodin, až poté smyjte. Pokud se objeví jakákoliv reakce, prosíme, ihned kontaktujte výrobce. Pokud žádnou reakci nemáte, aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM dle návodu k použití.

### Dodržujte doporučenou frekvenci používání:

Jestliže budete zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM používat méně často, než byste měli, je možné, že nebude mít tak dobré účinky. Pokud budete používat krém častěji, než byste měli, pokožku můžete ještě více podráždit.

### Upozornění

Není určeno pro děti mladší 3 let. Zdravotnický prostředek nepřibližujte k očím. Nepoužívejte na poraněnou pokožku. Pokud se u Vás projeví podráždění pokožky, vyhledejte lékaře. Než vystavíte pokožku slunečnímu záření, na místa, kde jste přípravek použili, naneste krém s ochranným faktorem. U méně než 1 % pacientů se může vyskytnout folikulitida.

### Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití přípravku vyhledejte pohotovostní lékařskou službu nejbližší nemocnice. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Po každém použití pečlivě uzavřete víčkem. Neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Uchovávejte při teplotě do 25 C, ale nezmrazujte.

### Vzhled zdravotnického prostředku

FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM je krém světle béžové barvy, s charakteristickou vůní.

### Složení krému

Paraffinum liquidum, Paraffinum solidum, Potato starch, Zinc oxide, Salicylic acid, Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) oil, Simmondsia chinensis (Jojoba) oil, Persea Gratissima (Avocado) oil, Daucus carota (Carrot) oil, Calendula officinalis flower extract, Citrus sinensis (Orange) oil, Triticum vulgare (Wheat germ) oil, Prunus armeniaca kernel (Apricot Kernel) oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) oil, Santalum Album (Sandalwood) oil, Pogostemon Cablin (Patchouli) oil, Dromiceius (Emu) oil, Citrus aurantium SSP. Bergamia (Bergamot) oil, Rosmarinus offinalis (Rosemary) oil, Pelargonium graveolens (Geranium) oil, Oenothera biennis (Evening primrose) oil, Eucalyptus globulus leaf (Eucalyptus) oil, Pinus sylvestris (Pine needle) oil, Chamomilla recutita matricaria flower (Chamomile) oil, Commiphora myrrha (Myrrh) oil, Citrus aurantium SSP Amara (Neroli) oil

### Výrobce:

V licenci společnosti Tirsell Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrálie  
Vyrobeno v EU pro FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika společnost **Biotika Bohemia s.r.o.**, Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratinetex.cz

Zdravotnický prostředek rizikové třídy I: Číslo certifikátu výrobce: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydáno společností URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnění 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.urs-certification.co.uk

EAN: 8594066380654



## Fungatinex Dr. Michaels Krém

príbalová informácia zdravotníckeho prostriedku



### Čo by ste mali vedieť o zdravotníckej pomôcke FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM

Tento príbalový leták informuje užívateľa o prínosoch a možných rizikách pri užívaní zdravotníckej pomôcky FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM. Uschovajte tento letáčik spolu s obalom na neskoršie nahliadnutie. Vždy pozorne čítajte informácie pre použitie a vezmite na vedomie všetky upozornenia. Používajte FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM len do uplynutia vyznačenej doby použiteľnosti alebo dátumu spotreby. Prostriedky nikdy neriedte, ani ich nemiešajte s inými produktmi. Prostriedok nanášajte vždy iba čistými rukami alebo aplikátorom, ktorý je pravidelne starostlivo umytý mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Ak na nanášanie prostriedku používate aplikátory, uistite sa, že budú vždy po použití umyté a nechajte ich vždy pred ďalším použitím úplne vysušiť. Zdravotnícky prostriedok s nikým iným nezdierajte.

### Na čo sa zdravotnícky prostriedok FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM používa?

Prípravok spolu s FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ poskytuje pokožke úľavu pri problémoch s plesňovými infekciami. Pomáha optimalizovať kožnú bariéru a mikrobiálnu rovnováhu. Kombinácia esenciálnych olejov a výťažkov z bylín má antimykotické a antibakteriálne vlastnosti a poskytuje úľavu pri svrbení a podráždení. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použiť oba produkty, pretože sa vzájomne dopĺňajú

### Použití zdravotníckeho prostriedku

Zdravotnícky prostriedok FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM spolu s FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ se aplikujú ve dvoch krokoch. Doporučujeme je použiť jednou denne

Prípravok FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ je špeciálne vyvinutý, aby pripravil pokožku na aplikáciu FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM tým, že ju jemne odmastí a vyčistí. Následne aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM. Nanášajte priamo na postihnuté miesta plesňovou infekciou. Krém aplikujte vždy jemným vmasírovaním do pokožky a nechajte voľne vstrebať.

### Skôr ako začnete zdravotnícku pomôcku používať

Skôr ako začnete používať zdravotnícku pomôcku FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM, VŽDY pred použitím najskôr vyskúšajte malé množstvo produktu na malej ploche pokožky, ako test na možné reakcie, obzvlášť ak budete produkt používať na citlivých miestach pokožky. Ponechajte na pokožke pôsobiť 24-48 hodín, až potom zmyte. Pokiaľ sa objaví akákoľvek reakcia, prosíme, ihneď kontaktujte výrobcu. Pokiaľ žiadnu reakciu nemáte, aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM podľa návodu na použitie.

### Dodržiujte odporúčanú frekvenciu používania:

Ak budete zdravotnícky prostriedok FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM používať menej často, než by ste mali, je možné, že nebude mať také dobré účinky. Pokiaľ budete používať krém častejšie, než by ste mali, pokožku môžete ešte viac podráždiť.

### Upozornenie

Nie je určené pre deti mladšie ako 3 roky. Zdravotnícky prostriedok nepribližujte k očiam. Nepoužívajte na poranenú pokožku. Pokiaľ sa u Vás prejaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekára. Kým vystavíte pokožku slnečnému žiareniu, na miesta, kde ste prípravok použili, naneste krém s ochranným faktorom. U menej ako 1 % pacientov sa môže vyskytnúť folikulitída.

### Bezpečnosť a skladovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia prípravku vyhľadajte pohotovostnú lekársku službu najbližšej nemocnice. NEVYVOLÁVajte zvracanie. Po každom použití starostlivo uzavrite viečkom. Neskladujte na priamom slnku ani v blízkosti zdrojov tepla. Uchovávajte pri teplote do 25 C, ale nezmrazujte.

### Vzhľad zdravotníckeho prostriedku

FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM je krém svetle béžovej farby, s charakteristickou vôňou.

### Zloženie krému

Paraffinum liquidum, Paraffinum solidum, Potato starch, Zinc oxide, Salicylic acid, Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) oil, Simmondsai chinensis (Jojoba) oil, Persea Gratissima (Avocado) oil, Daucus carota (Carrot) oil, Calendula officinalis flower extract, Citrus sinensis (Orange) oil, Triticum vulgare (Wheat germ) oil, Prunus armeniaca kernel (Apricot Kernel) oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) oil, Santalum Album (Sandalwood) oil, Pogostemon Cablin (Patchouli) oil, Dromiceius (Emu) oil, Citrus aurantium SSP. Bergamia (Bergamot) oil, Rosmarinus offinalis (Rosemary) oil, Pelargonium graveolens (Geranium) oil, Oenothera biennis (Evening primrose) oil, Eucalyptus globulus leaf (Eucalyptus) oil, Pinus sylvestris (Pine needle) oil, Chamomilla recutita matricaria flower (Chamomile) oil, Commiphora myrrha (Myrrh) oil, Citrus aurantium SSP Amara (Neroli) oil

### Výrobca:

V licencii spoločnosti Tírsel Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrália  
Vyrobené v EU pre FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika spoločnosťou Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratínex.cz

Zdravotnícky prostriedok rizikovej triedy 1: Číslo certifikátu výrobcu: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydané spoločnosťou URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnenia 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.-certification.co.uk