

Fungatinex

Dr. Michaels Sprej

Fungatinex Dr. Michaels Sprej

příbalová informace zdravotnického prostředku



Co byste měli vědět o zdravotnickém prostředku FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ

Tento příbalový leták informuje uživatele o přínosech a možných rizicích při užívání zdravotnického prostředku FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ. Uchovejte tento letáček spolu s obalem k pozdějšímu nahlédnutí. Vždy pozorně čtěte informace pro použití a vezměte na vědomí všechna upozornění. Používejte FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ jen do uplynutí vyznačené doby použitelnosti produktu data spotřeby. Prostředek nikdy neředte, ani je nemíchejte s jinými produkty. Prostředek nanášejte vždy pouze čistýma rukama nebo aplikátorem, který je pravidelně pečlivě umyt mýdlem nebo jemným čisticím prostředkem. Jestliže k nanášení prostředku používáte aplikátory, ujistěte se, že budou vždy po použití umyty a nechte je vždy před dalším použitím úplně vysušit. Zdravotnický prostředek s nikým jiným nesledjte.

K čemu se zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ používá?

Přípravek připravuje pokožku na aplikaci FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM společně poskytuje pokožce úlevu při problémech s plísňovými infekcemi. Pomáhá optimalizovat kožní bariéru a mikrobiální rovnováhu. Kombinace esenciálních olejů a výtažků z bylin má antimykotické a antibakteriální vlastnosti a poskytuje úlevu při svědění a podráždění. Pro dosažení nejlepších výsledků je třeba použít oba produkty, protože se vzájemně doplňují.

Použití zdravotnického prostředku

Zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ by spolu s FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM měl obsahovat dva vzájemně se doplňující produkty, které se aplikují ve dvou krocích. Doporučujeme je použít jednou denně.

Přípravek FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ je speciálně vyvinutý, aby připravil pokožku pro aplikaci FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM tím, že ji jemně odmastí a vyčistí. Sprej zároveň obsahuje ingredience známé pro své antibakteriální a antimykotické účinky. Přípravek má silný zklidňující a zjemňující účinek. Odstraňuje zbytky mastnoty a nečistot a připravuje pokožku k absorpci krému. Podporuje kožní mikroflóru a zneškodňuje patogenní bakterie a dermatofyty. Redukuje zánícený a zlepšuje hydrataci. Přípravek posiluje kožní bariéru a snižuje pocit svědění.

Aplikaci na pokožku provádějte nanesením přípravku na kosmetický tampon, jemně vetřete do pokožky a nechte působit. Neoplachujte. Poté je možné aplikovat krém. Na pokožku hlavy ve vlasové části aplikujte přípravek buď rozprašovačem, nebo kapátkem.

Následně aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM. Nanášejte přímo na postižená místa plísňovou infekcí. Krém aplikujte vždy jemným vmasírováním do pokožky a nechte volně vsřebat.

Než začnete zdravotnický prostředek používat

Než začnete používat zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ, VŽDY před použitím nejdříve vyzkoušejte malé množství obou produktů na malé ploše pokožky, jako test na možné reakce, obzvláště budete-li produkt používat na citlivých místech pokožky. Ponechte na pokožce působit 24–48 hodin, až poté smyjte. Pokud se objeví jakákoliv reakce, prosíme, ihned kontaktujte výrobce. Pokud žádnou reakci nemáte, aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ dle návodu k použití.

Dodržujte doporučenou frekvenci používání:

Jestliže budete zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ používat méně často, než byste měli, je možné, že nebude mít tak dobré účinky. Pokud budete používat SPREJ častěji, než byste měli, pokožku můžete ještě více podráždit.

Upozornění

Není určeno pro děti mladší 3 let. Zdravotnický prostředek nepřibližujte k očím. Nepoužívejte na poraněnou pokožku. Pokud se u Vás projeví podráždění pokožky, vyhledejte lékaře. Než vystavíte pokožku slunečnímu záření, na místa, kde jste přípravek použili, naneste krém s ochranným faktorem. U méně než 1 % pacientů se může vyskytnout folikulitida.

Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití přípravku vyhledejte pohotovostní lékařskou službu nejbližší nemocnice. NEVYVOĽÁVEJTE zvracení. Po každém použití pečlivě umývejte víčkem. Neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, ale nezmrazujte.

Vzhled zdravotnického prostředku

FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ je tekutina, průzračné barvy, s charakteristickou vůní.

Složení spreje

Deionised water, Glycerin, Caprylyl/Capryl Glucoside, Xylitol, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Centipeda Cunninghamii extract, α-glucan oligosaccharide, Menthyl ethylamido Oxalate, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerol caprylate, Aloe vera, 4-terpineol, Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate, Butylene Glycol, Pentylen Glycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Farnesol

Výrobce:

V licenci společnosti Tirsell Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy., Frankston, VIC 3199, Austrálie

Vyrobeno v EU pro FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika společností Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratinex.cz

Zdravotnický prostředek rizikové třídy 1: Číslo certifikátu výrobce: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydáno společností URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnění 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.urs-certification.co.uk

EAN: 8594066380760



Fungatinex Dr. Michaels Sprej

príbalová informácia zdravotníckeho prostriedku



Čo by ste mali vedieť o zdravotníckej pomôcke FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ

Tento príbalový leták informuje užívateľa o prínosoch a možných rizikách pri užívaní zdravotníckej pomôcky FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ. Uchovajte tento letáčik spolu s obalom na neskoršie nahliadnutie. Vždy pozorne čítajte informácie pre použitie a vezmite na vedomie všetky upozornenia. Používajte FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ len do uplynutia vyznačenej doby použiteľnosti produktu dátumu spotreby. Prostriedok nikdy neriedte, ani ich nemiešajte s inými produktmi. Prostriedok nanášajte vždy iba čistými rukami alebo aplikátorom, ktorý je pravidelne starostlivo umyť mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Ak na nanášanie prostriedku používate aplikátory, uistite sa, že budú vždy po použití umyté a nechajte ich vždy pred ďalším použitím úplne vysušiť. Zdravotnícky prostriedok s nikým iným nezdieľajte.

Na čo sa zdravotnícky prostriedok FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ používa?

Prípravok pripravuje pokožku na aplikáciu FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM spoločne poskytuje pokožke úľavu pri problémoch s plesňovými infekciami. Pomáha optimalizovať kožnú bariéru a mikrobiálnu rovnováhu. Kombinácia esenciálnych olejov a výťažkov z bylín má antymykotické a antibakteriálne vlastnosti a poskytuje úľavu pri svrbení a podráždení. Na dosiahnutie najlepších výsledkov je potrebné použiť oba produkty, pretože sa vzájomne dopĺňajú.

Použitie zdravotníckej pomôcky

Zdravotnícky prostriedok FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ by spolu s FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM mal obsahovať dva vzájomne sa dopĺňajúce produkty, ktoré sa aplikujú v dvoch krokoch. Odporúčame ich použiť raz denne.

Prípravok FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ je špeciálne vyvinutý, aby pripravil pokožku na aplikáciu FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM tým, že ju jemne odmastí a vyčistí. Sprej zároveň obsahuje ingrediencie známe pre svoje antibakteriálne a antymykotické účinky. Prípravok má silný upokojujúci a zjemňujúci účinok. Odstraňuje zvyšky mastnoty a nečistôt a pripravuje pokožku na absorpciu krému. Podporuje kožnú mikroflóru a zneškodňuje patogénne baktérie a dermatofyty. Redukuje zapálenie a zlepšuje hydratáciu. Prípravok posilňuje kožnú bariéru a znižuje pocit svrbenia. Aplikáciu na pokožku vykonávajte nanosením prípravku na kozmetický tampón, jemne votrite do pokožky a nechajte pôsobiť. Neoplachujte. Potom je možné aplikovať krém. Na pokožku hlavy vo vlasovej časti aplikujte prípravok buď rozprašovačom, alebo kvapkadlom.

Následne aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM. Nanášajte priamo na postihnuté miesta plesňovou infekciou. Krém aplikujte vždy jemným vmasírovaním do pokožky a nechajte voľne vstrebať.

Skôr ako začnete zdravotnícku pomôcku používať

Skôr ako začnete používať zdravotnícku pomôcku FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ, VŽDY pred použitím najskôr vyskúšajte malé množstvo oboch produktov na malej ploche pokožky, ako test na možné reakcie, obzvlášť ak budete produkt používať na citlivých miestach pokožky. Ponechajte na pokožke pôsobiť 24–48 hodín, až potom zmyte. Pokiaľ sa objaví akákoľvek reakcia, prosíme, ihneď kontaktujte výrobcu. Pokiaľ žiadnu reakciu nemáte, aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ podľa návodu na použitie.

Dodržiujte odporúčanú frekvenciu používania:

Ak budete zdravotnícky prostriedok FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ používať menej často, než by ste mali, je možné, že nebude mať také dobré účinky. Pokiaľ budete používať SPREJ častejšie, než by ste mali, pokožku môžete ešte viac podráždiť.

Upozornenie

Nie je určené pre deti mladšie ako 3 roky. Zdravotnícky prostriedok nepribližujte k očiam. Nepoužívajte na poranenú pokožku. Pokiaľ sa u Vás prejaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekára. Kým vystavíte pokožku slnečnému žiareniu, na miesta, kde ste prípravok použili, naneste krém s ochranným faktorom. U menej ako 1 % pacientov sa môže vyskytnúť folikulitída.

Bezpečnosť a skladovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia prípravku vyhľadajte pohotovostnú lekársku službu najbližšej nemocnice. NEVYVOLÁVAJE zvracanie. Po každom použití starostlivo uzavrite viečko. Neskladujte na priamom slnku ani v blízkosti zdrojov tepla. Uchovávajte pri teplote do 25 °C, ale nezmrazujte.

Vzhľad zdravotníckej pomôcky

FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ je tekutina, priezračné farby, s charakteristickou vôňou.

Zloženie spreja

Deionised water, Glycerine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Xylitol, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Centipeda Cunninghamii, α-glucan oligosaccharide, Menthyl ethylamido Oxalate, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glyceryl caprylate, Aloe vera, 4-terpineol, Sodium Laurylglycosides Hydroxypropylsulfonate, Butylene Glycol, Pentyleneglycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Farnesol

Výrobca:

V licencií spoločnosti Tinsel Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrália

Vyrobené v EU pre FRANK Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika spoločnosťou Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratinex.cz

Zdravotnícky prostriedok rizikovej triedy 1: Číslo certifikátu výrobcu: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydané spoločnosťou URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnenia 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www. -certification.co.uk