

Soratinex Dr. Michaels Gel

příbalová informace zdravotnického prostředku



Použití

Zdravotnický prostředek vyvinutý pro péči o suchou, odlupující se a zanícenou pokožku, postiženou lupénkou. Přispívá ke zmírnění šupinatění. Soratinex Dr. Michaels Gel je speciálně vyvinutý zdravotnický prostředek na odstranění projevů lupénky. Pomáhá zlepšení stavu kůže. Hlavními složkami jsou přírodní ovocné kyseliny, které pozitivně ovlivňují rozsah loupání, uhlazují kůži a změkčují ji. Odstraňuje její ztvrdlou a odumřelou horní vrstvu, aby se do kůže správně vstřebal krém, díky čemuž dochází k celkovému hojivému účinku. Neobsahuje steroidy.

Návody k použití a doporučená aplikace

Pokožka hlavy: Navlhčete vlasy, naneste Čistící gel na pokožku hlavy a jemně ho vmasírujte. Po 3–4 minutách důkladně opláchněte teplou vodou. Na pokožku hlavy používejte pouze ráno. Ráno se po čistícím gelu již mast a tělový olej nepoužívají, protože by vlasy byly mastné. **Tělo:** Navlhčete postiženou oblast, naneste a vmasírujte pomocí houbičky nebo jemné žinky Čistící gel. Po 3–4 minutách důkladně opláchněte teplou vodou. Pokožku osušte jemným přikládáním ručníku.

Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme používat Soratinex Dr. Michaels gel v kombinaci se Soratinex Dr. Michaels krémem, protože se vzájemně doplňují. Také doporučujeme po aplikaci Soratinex Dr. Michaels krému použít Soratinex Dr. Michaels olej, protože ten pomůže prodloužit účinek krému v pokožce, a napomáhá jejímu zvlhčení a hydrataci. Celou trojkombinaci nanášejte nejlépe 2x denně po dobu 6–8 týdnů bez přerušení. Následující odkaz směřuje na detailní instruktážní video, na stránkách výrobce: <https://www.franklpharma.cz/clanek/jak-se-pouzivaji-pripravky-dr-michaels>

Důležitá upozornění

Uchovávejte tento příbalový leták spolu s obalem Soratinex Dr. Michaels gel k pozdějšímu nahlédnutí. Vždy prosím pozorně čtěte informace pro použití a vezměte na vědomí všechna upozornění. Používejte zdravotnický prostředek Soratinex jen do uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na obalu. Gel nikdy nedejte, ani ho nemíchejte s jinými produkty. Zdravotnický prostředek Soratinex Dr. Michaels gel s nikým jiným nesdílejte. Jestliže budete používat přípravky Soratinex Dr. Michaels méně často, nebo v rozporu s tímto návodem, je možné, že nebude mít účinky, které očekáváte a potíže se suchou, odlupující se a zanícenou pokožkou se nebudou zlepšovat. Pokud budete používat přípravky Soratinex Dr. Michaels častěji, než byste měli, projevy ložiskové lupénky na vaší pokožce neustanou rychleji, naopak, pokožku můžete ještě více podráždít. Přípravek není určen pro děti mladších 3 let. Obsahuje kyselinu salicylovou. Nedoporučuje se pro těhotné nebo kojící ženy. Přípravky přestaňte používat, jestliže se u Vás projeví podráždění nebo vyrážka. Vždy před prvním použitím nejdříve vyzkoušejte malé množství gelu na malé ploše pokožky jako test na možné reakce, a to obzvláště budete-li gel požívat na citlivých místech pokožky. Ponechte na pokožce gel působit 24–48 hodin, až poté smyjte. Pokud se objeví jakákoli reakce, ihned kontaktujte odpovědnou osobu. Pokud žádnou reakci nemáte, aplikujte Soratinex Dr. Michaels gel dle návodu k použití. Kožní aplikace může zvýšit citlivost na sluneční záření (UVB). Než vystavíte pokožku slunečnímu záření na místa, kde jste aplikovali gel použijte krém s vysokým ochranným faktorem.

Vzhled

Soratinex Dr. Michaels gel je hustá tekutina průzračné až neprůhledné barvy s charakteristickou vůní.

Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití přípravku vyhledejte pohotovostní lékařskou službu nejbližší nemocnici. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zdravotnický prostředek nepřiblížte ke očím. Nepoužívejte na poraněnou nebo zanícenou pokožku. U méně než 1 % pacientů se může vyskytnout folikulitida. Po každém použití pečlivě uzavřete víčkem. Neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, ale nezmrazujte.

Složení

Water, SLS, Dipropyl cocamido betaine, TEA lauryl sulfate, Triethanolamine, Salicylic acid, 1.75% Cocamide DEA, Carbomer, Citric acid, Glycolic acid, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone Methylisothiazoline

Zdravotnický prostředek byl mikrobiologicky a dermatologicky testován.

Výrobce a odpovědná osoba

Pro společnost FRANKL Pharma, s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika, vyrobila Biotika Bohemia spol. s r.o., Durychova 101/66, Lhotka, 142 00 Praha, Česká republika, v licenci Tirsell Pty. Ltd, Austrálie, Telefon: +420 722 678 600, E-mail: info@franklpharma.eu, www.franklpharma.cz

Zdravotnický prostředek rizikové třídy 1 Číslo certifikátu výrobce: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydáno společností URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnění 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz

Soratinex Dr. Michaels Gel

príbalová informácia zdravotníckeho prostriedku



Použitie

Zdravotnícky prostriedok vyvinutý na starostlivosť o suchú, odlupujúcu sa a zapálenú pokožku, postihnutú psoriázou. Prispieva k zmierneniu vzniku šupín. Soratinex Dr. Michaels Gél je špeciálne vyvinutý zdravotnícky prostriedok na odstránenie prejavov psoriázy. Pomáha k zlepšeniu stavu kože. Hlavnými zložkami sú prírodné ovocné kyseliny, ktoré pozitívne ovplyvňujú rozsah odlupovania, vyhladzujú kožu a zmäkčujú ju. Odstraňuje jej stvrdnutú a odumretú hornú vrstvu, aby sa do kože správne vstrebal krém, vďaka čomu dochádza k celkovému hojivému účinku. Neobsahuje steroidy.

Návod na použitie a doporučený spôsob aplikácie

Pokožka hlavy: Navlhčite vlasy, naneste Čistiaci gél na pokožku hlavy a jemne ho vmasírujte. Po 3-4 minútach dôkladne opláchnite teplou vodou. Na pokožku hlavy používajte iba ráno. Ráno sa po čistiacom géli už masť a telový olej nepoužívajte, pretože by vlasy boli masťné. **Telo:** Navlhčite postihnutú oblasť, naneste a vmasírujte pomocou špongie alebo jemnej žinky Čistiaci gél. Po 3-4 minútach dôkladne opláchnite teplou vodou. Pokožku osušte jemným prikladáním uteráku.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame používať Soratinex Dr. Michaels gél v kombinácii so Soratinex Dr. Michaels krémom, pretože sa vzájomne dopĺňajú. Tiež odporúčame po aplikácii Soratinex Dr. Michaels krému použiť Soratinex Dr. Michaels olej, pretože ten pomáha predĺžiť účinok krému v pokožke a napomáha jej zvlhčeniu a hydratácii. Celú trojkombináciu nanášajte najlepšie 2x denne po dobu 6-8 týždňov bez prerušenia. V nasledujúcom odkaze sa nachádza detailné inštruktážne video, na stránkach výrobcu: <https://www.franklpharma.cz/clanek/jak-se-pouzivaji-pripravky-dr-michaels>

Dôležité upozornenia

Uchovávajte tento príbalový leták spolu s obalom Soratinex Dr. Michaels gél pre prípad potreby náhľadu v budúcnosti. Vždy si prosím pozorne prečítajte informácie na použitie a vezmite na vedomie všetky upozornenia. Používajte zdravotnícky prostriedok Soratinex len do uplynutia doby použiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale. Gél nikdy neriedte, ani ho nemiešajte s inými produktmi. Zdravotnícky prostriedok Soratinex Dr. Michaels gél s nikým iným nezdieľajte. Ak budete používať prípravky Soratinex Dr. Michaels menej často, alebo v rozpore s týmto návodom, je možné, že nebude mať účinky, ktoré očakávate a ťažkosti so suchou, odlupujúcou sa a zapálenou pokožkou sa nebudú zlepšovať. Ak budete používať prípravky Soratinex Dr. Michaels častejšie, než by ste mali, prejavy ložiskovej psoriázy na vašej pokožke neodznajú rýchlejšie, naopak, pokožku môžete ešte viac podráždiť. Liek nie je určený pre deti do 3 rokov. Obsahuje kyselinu salicylovú. Neodporúča sa pre tehotné alebo dojčiacie ženy. Prípravky prestaňte používať, ak sa u Vás prejaví podráždenie alebo vyrážka. Vždy pred prvým použitím najskôr vyskúšajte malé množstvo gélu na malej ploche pokožky ako test na možné reakcie a to obzvlášť ak budete gél požívať na citlivých miestach pokožky. Nechajte na pokožke gél pôsobiť 24-48 hodín, až potom zmyte. Ak sa objaví akákoľvek reakcia, ihneď kontaktujte zodpovednú osobu. Ak žiadnu reakciu nepozorujete, aplikujte Soratinex Dr. Michaels gél podľa návodu na použitie. Kožná aplikácia môže zvýšiť citlivosť na slnečné žiarenie (UVB). Než vystavíte pokožku slnečnému žiareniu na miesta, kde ste aplikovali gél použite krém s vysokým ochranným faktorom.

Vzhľad

Soratinex Dr. Michaels gél je hustá tekutina priesačnej až nepriehľadnej farby s charakteristickou vôňou.

Bezpečnosť a skladovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia lieku vyhľadajte pohotovostnú lekársku službu najbližšej nemocnice. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Zdravotnícky prostriedok nepribližujte k očiam. Nepoužívajte na poranenú alebo zapálenú pokožku. U menej ako 1 % pacientov sa môže vyskytnúť folikulitída. Po každom použití starostlivo uzavrite viečko. Neskladujte na priamom slnku ani v blízkosti zdrojov tepla. Uchovávajte pri teplote do 25 ° C, ale nezmrazujte.

Zloženie

Water, SLS, Dipropyl cocamidobetaine, TEA lauryl sulfate, Triethanolamine, Salicylic acid, 1.75% Cocamide DEA, Carbomer, Citric acid, Glycolic acid, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone Methylisothiazolinone

Zdravotnícky prostriedok bol mikrobiologicky a dermatologicky testovaný.

Výrobca a zodpovedná osoba

Pre spoločnosť FRANKL Pharma, s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika, výroba Biotika Bohemia spol. s r.o., Durychova 101/66, Lhotka, 142 00 Praha, Česká republika, v licencií Tirsell Pty. Ltd, Austrália, Telefón: +420 722 678 600, E-mail: info@franklpharma.eu, www.franklpharma.cz

Zdravotnícky prostriedok rizikovej triedy 1 Číslo certifikátu výrobcu: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydané spoločnosťou URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnenia 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz