

Soratinex Dr. Michaels Krém 250g/50g

příbalová informace zdravotnického prostředku



Použití

Soratinex Dr. Michaels krém 50g nebo 250g je zdravotnický prostředek k ošetření pokožky postižené lupénkou, nebo suché, odlupující se a zanícené pokožky, ve vlasové části hlavy a na těle u dospělých. Napomáhá odstranění kožních projevů lupénky.

Návod k použití a doporučená aplikace

Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme používat Soratinex Dr. Michaels krém v kombinaci se Soratinex Dr. Michaels gel, protože se vzájemně doplňují. Také doporučujeme po aplikaci Soratinex Dr. Michaels krému použít Soratinex Dr. Michaels olej, protože ten pomůže prodloužit účinek krému v pokožce, a napomáhá jejímu zvlhčení a hydrataci. Krém nanášejte 2x denně jemným vmasírováním do pokožky. Pokožku nevystavujte bezprostředně po aplikaci přípravku slunečnímu záření po dobu minimálně čtyř hodin a naneste krém s vysokým ochranným faktorem.

Soratinex Dr. Michaels krém má zvlhčující účinky, zklidňuje pokožku a zajistí hojení a hydrataci. Následným použitím Soratinex Dr. Michaels oleje po aplikaci Soratinex Dr. Michaels krému zvýšíte účinnost krému, udržíte pokožku zvlhčenou a zpomalíte vytvoření nových šupin. Přípravky Soratinex Dr. Michaels doporučujeme souvisle používat po dobu 6–8 týdnů, Soratinex Dr. Michaels olej můžete používat bez omezení

Důležitá upozornění

Uschovejte tento příbalový leták spolu s obalem Soratinex Dr. Michaels krém k pozdějšímu nahlédnutí. Vždy prosím pozorně čtěte informace pro použití a vezměte na vědomí všechna upozornění. Používejte zdravotnický prostředek Soratinex jen do uplynutí vyznačené doby použitelnosti, která je vyznačena na obalu. Krém nikdy neředte, ani ho nemíchejte s jinými produkty. Nanášejte jej čistými rukama nebo aplikátorem. Jestliže k nanášení krému používáte aplikátory, ujistěte se, že budou po použití umyty a nechte je vždy před dalším použitím úplně vysušit. Zdravotnický prostředek Soratinex Dr. Michaels krém s nikým jiným nesdílejte. Jestliže budete používat Soratinex Dr. Michaels krém méně často, než byste měli, je možné, že nebude mít tak dobré účinky a potíže se suchou, odlupující se a zanícenou pokožkou se nebudou zlepšovat. Pokud budete používat Soratinex Dr. Michaels krém častěji, než byste měli, potíže se suchou, odlupující se a/nebo zanícenou kůží neustanou rychleji, naopak, pokožku můžete ještě více podráždit.

Přípravek není určen pro děti mladších 3 let. Obsahuje kyselinu salicylovou. Nedoporučuje se pro těhotné nebo kojící ženy. Přestaňte používat, jestliže se u Vás projeví podráždění nebo vyrážka. Kožní aplikace může zvýšit citlivost na sluneční záření (UVB). Obsahuje stopové prvky těchto látek: citronellol, kumaryn, farnesol, geraniol, limonen a linalool. Někteří pacienti mohou po aplikaci pociťovat mravenčení, pálení nebo svědění. Tyto pocity obvykle ustanou po cca 20 minutách, nepřetrvávají déle. Jestliže se reakce zhorší, připravte ihned smyjte vodou a mýdlem. U méně než 1 % pacientů se může vyskytnout folikulitida. V případě projevu jakékoliv nepříznivé reakce přestaňte ihned výrobek používat a vyhledejte lékaře. Než začnete Soratinex Dr. Michaels krém používat VŽDY před použitím nejdříve vyzkoušejte malé množství přípravku na malé ploše pokožky jako test na možné reakce, obzvláště budete-li přípravek používat na citlivých místech pokožky. Ponechte na pokožce působit 24 – 48 hodin, až poté smyjte. Pokud se objeví jakákoliv reakce, prosíme, ihned kontaktujte odpovědnou osobu. Pokud žádnou reakci nemáte, aplikujte Soratinex Dr. Michaels krém dle návodu k použití.

Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití přípravku vyhledejte pohotovostní lékařskou službu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Po každém použití pečlivě uzavřete víčkem. Neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, ale nezmrazujte.

Vzhled

Soratinex Dr. Michaels je světle béžové barvy, s charakteristickou vůní.

Složení

Liquid paraffin, Solid paraffin, Potato, Zinc oxide, Salicylic acid 1.75%, Almond oil, Jojoba oil, Avocado oil, Carrot oil, Marigold extract, Citrus sinensis oil, Wheat germ oil, Apricot seed oil, Lavender oil, Sandalwood oil, Patchouli oil, Pelargonium capitatum, Rosemary extract, Emu oil, Bergamot oil, Evening primrose oil, Eucalyptus oil, Forest pine needle oil, Chamomile oil, Myrrh oil, bitter orange flowers oil

Zdravotnický prostředek byl mikrobiologicky a dermatologicky testován

Výrobce a odpovědná osoba

Pro společnost FRANKL Pharma, s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika, vyrobila Biotika Bohemia spol. s r.o., Durychova 101/66, Lhotka, 142 00 Praha, Česká republika, v licenci Tirsell Pty. Ltd, Austrálie, Telefon: +420 722 678 600, E-mail: info@franklpharma.eu, www.franklpharma.cz

50g - EAN: 8594163096533

250g - EAN: 8594163093563

Soratinex Dr. Michaels Krém 250g/50g

príbalová informácia zdravotníckeho prostriedku



Použitie

Soratinex Dr. Michaels krém 50g alebo 250g je zdravotnícky prostriedok na ošetrovanie pokožky postihnutej psoriázou, alebo suchej, odlupujúcej sa a zapálenej pokožky vo vlasatej časti hlavy a na tele u dospelých. Napomáha odstráneniu kožných prejavov psoriázy.

Návod na použitie a doporučený spôsob aplikácie

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov, odporúčame používať Soratinex Dr. Michaels krém v kombinácii so Soratinex Dr. Michaels géľ, pretože sa vzájomne dopĺňajú. Tiež odporúčame po aplikácii Soratinex Dr. Michaels krému použiť Soratinex Dr. Michaels olej, pretože ten pomáha predĺžiť účinok krému na pokožke, a napomáha jej zvlhčeniu a hydratácii. Krém nanášajte 2x denne jemným vmasírovaním do pokožky.

Soratinex Dr. Michaels krém má zvlhčujúce účinky, upokojuje pokožku a zabezpečuje hojenie a hydratáciu. Následným použitím Soratinex Dr. Michaels oleja po aplikácii Soratinex Dr. Michaels krému, zvýšite účinnosť krému, udržíte pokožku zvlhčenú a spomalíte tvorbu nových šupín. Prípravky Soratinex Dr. Michaels odporúčame používať súvisle, po dobu 6-8 týždňov, Soratinex Dr. Michaels olej môžete používať bez obmedzenia.

Dôležité upozornenia

Uchovávajte tento príbalový leták, spolu s obalom Soratinex Dr. Michaels krém pre prípad potreby náhľadu v budúcnosti. Vždy si prosím pozorne prečítajte informácie na použitie a vezmite na vedomie všetky upozornenia. Používajte zdravotnícky prostriedok Soratinex len do uplynutia vyznačenej expirácie, ktorá je vyznačená na obale. Krém nikdy neriedte, ani ho nemiešajte s inými produktmi. Nanášajte ho čistými rukami alebo aplikátorom, ktorý je potrebné pravidelne starostlivo umývať mydlom, alebo jemným čistiacim prostriedkom. Ak na nanášanie krému používate aplikátory, uistite sa, že budú po použití umyté a nechajte ich vždy pred ďalším použitím úplne vysušiť. Zdravotnícky prostriedok Soratinex Dr. Michaels krém s nikým iným nezdieľajte.

Ak budete používať Soratinex Dr. Michaels krém menej často, ako by ste mali, je možné, že nebude mať tak dobré účinky a ťažkosti so suchou, odlupujúcou sa a zapálenou pokožkou sa nebudú zlepšovať. Ak budete používať Soratinex Dr. Michaels krém častejšie, než by ste mali, problémy so suchou, odlupujúcou sa a / alebo zapálenou kožou neodznajú rýchlejšie, naopak, môžete pokožku ešte viac podráždiť.

Liek nie je určený pre deti do 3 rokov. Obsahuje kyselinu salicylovú. Neodporúča sa pre tehotné alebo dojčiacie ženy. Prestaňte používať, ak sa u Vás prejaví podráždenie alebo objavia vyrážky. Kožná aplikácia môže zvýšiť citlivosť na slnečné žiarenie (UVB). Obsahuje stopové prvky týchto látok: citronello, kumaryn, farnesol, geraniol, limonén a linalool. Niektorí pacienti môžu po aplikácii pociťovať mravčenie, pálenie alebo svrbenie. Tieto pocity zvyčajne ustúpia po cca 20 minútach a netrvajú dlhšie. Ak sa reakcia zhorší, okamžite umyte vodou a mydlom. U menej ako 1% pacientov sa môže vyskytnúť folikulitída. V prípade prejavu akejkoľvek nepriaznivej reakcie prestaňte ihneď výrobok používať a vyhľadajte lekára.

Nezачnete Soratinex Dr. Michaels krém používať VŽDY pred použitím najskôr vyskúšajte malé množstvo prípravku na malej ploche pokožky ako test na možné reakcie, obzvlášť ak budete pripravok používať na citlivých miestach pokožky. Nechajte na pokožke pôsobiť 24 - 48 hodín, až potom zmyte. Ak sa objavia akákoľvek reakcia, prosíme, ihneď kontaktujte zodpovednú osobu. Ak žiadnu reakciu nemáte, aplikujte Soratinex Dr. Michaels krém podľa návodu na použitie.

Bezpečnosť a skladovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia lieku vyhľadajte pohotovostnú lekársku službu najbližšej nemocnice. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Po každom použití starostlivo uzavrite viečkom. Neskladujte na priamom slnku ani v blízkosti zdrojov tepla. Uchovávajte pri teplote do 25 ° C, ale nezmrazujte.

Vzhľad

Soratinex Dr. Michaels je svetlo béžovej farby, s charakteristickou vôňou.

Zloženie

Liquid paraffin, Solid paraffin, Potato, Zinc oxide, Salicylic acid 1.75%, Almond oil, Jojoba oil, Avocado oil, Carrot oil, Marigold extract, Citrus sinensis oil, Wheat germ oil, Apricot seed oil, Lavender oil, Sandalwood oil, Patchouli oil, Pelargonium capitatum, Rosemary extract, Emu oil, Bergamot oil, Evening primrose oil, Eucalyptus oil, Forest pine needle oil, Chamomile oil, Myrrh oil, bitter orange flowers oil

Zdravotnícky prostriedok bol mikrobiologicky a dermatologicky testovaný

Výrobca a zodpovedná osoba

Pre spoločnosť FRANKL Pharma, s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika, vyrobila Biotika Bohemia spol. s.r.o., Durychova 101/66, Lhotka, 142 00 Praha, Česká republika, v licencií Tirsell Pty. Ltd, Austrália Telefón: +420 722 678 600, E-mail: info@franklpharma.eu, www.franklpharma.cz

50g - EAN: 8594163096533

250g - EAN: 8594163093563