



Soratinex®

Dr. Michaels Sada na lupénku

Soratinex Dr. Michaels Sada na lupénku



příbalová informace zdravotnického prostředku

Co byste měli vědět o zdravotnickém prostředku SORATINEX DR. MICHAELS SADA NA LUPÉNKU

Tento příbalový leták informuje uživatele o přínosech a možných rizicích při užívání zdravotnického prostředku SORATINEX DR. MICHAELS SADA NA LUPÉNKU. Uschovejte tento letáček spolu s obalem k pozdějšímu nahlédnutí. Vždy pozorně čtěte informace pro použití a vezměte na vědomí všechna upozornění. Používejte SORATINEX DR. MICHAELS SADU NA LUPÉNKU jen do uplynutí vyznačené doby použitelnosti jednotlivých produktů Sady nebo data spotřeby. Prostředky nikdy neředte, ani je nemíchejte s jinými produkty. Prostředky nanášejte vždy pouze čistými rukama nebo aplikátorem, který je pravidelně pečlivě umyt mýdlem nebo jemným čisticím prostředkem. Jestliže k nanášení prostředků používáte aplikátory, ujistěte se, že budou vždy po použití umyty a nechte je vždy před dalším použitím úplně vysušit. Zdravotnický prostředek s nikým jiným nesdílejte.

K čemu se zdravotnický prostředek SORATINEX DR. MICHAELS SADA NA LUPÉNKU používá?

SORATINEX DR. MICHAELS SADA NA LUPÉNKU se používá k péči o suchou, odlupující se a zanícenou pokožku postiženou lupénkou nebo atopickým ekzémem ve vlasové části hlavy a na těle u dospělých, ke zmírnění šupinatění způsobených lupénkou. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat všechny produkty obsažené v sadě, tedy SORATINEX DR. MICHAELS KRÉM 50G A 250G v kombinaci se zdravotnickým prostředkem SORATINEX DR. MICHAELS GEL 200ml a SORATINEX DR. MICHAELS OLEJ 200ml, protože se vzájemně doplňují.

Použití zdravotnického prostředku

Zdravotnický prostředek SORATINEX DR. MICHAELS SADA NA LUPÉNKU obsahuje tři vzájemně se doplňující produkty, které se aplikují ve třech krocích.

Nejprve použijte SORATINEX DR. MICHAELS GEL 200ml 1x denně, nejlépe ráno, tak, že jej naneste na mokrou pokožku, napěňte mycí houbou nebo aplikátorem a po 2–3 minutách opláchněte teplou vodou.

Následně aplikujte SORATINEX DR. MICHAELS KRÉM 50g nebo 250g. Krém aplikujte vždy jemným vmasírováním do pokožky a nechte volně vstřebat. Krém použijte dvakrát denně. Poprvé, nejlépe ráno po aplikaci gelu a podruhé s časovým odstupem, nejlépe večer, již bez aplikace gelu.

Vždy po aplikaci krému postižené místo ošetřete SORATINEX DR. MICHAELS OLEJ 200ml. Ten zajistí uchování aktivního účinku krému v postižené pokožce. Olej aplikujete vždy jemným vmasírováním do pokožky a nechte vstřebat.

Než začnete zdravotnický prostředek používat

Než začnete používat zdravotnický prostředek SORATINEX DR. MICHAELS SADA NA LUPÉNKU, VŽDY před použitím nejdříve vyzkoušejte malé množství všech produktů na malé ploše pokožky, jako test na možné reakce, obzvláště budete-li produkty používat na citlivých místech pokožky. Ponechte na pokožce působit 24–48 hodin, až poté smyjte. Pokud se objeví jakákoliv reakce, prosíme, ihned kontaktujte výrobce. Pokud žádnou reakci nemáte, aplikujte SORATINEX DR. MICHAELS SADA dle návodu k použití.

Dodržujte doporučenou frekvenci používání:

Jestliže budete zdravotnický prostředek SORATINEX DR. MICHAELS SADA NA LUPÉNKU používat méně často, než byste měli, je možné, že nebude mít tak dobré účinky a potíže se suchou, odlupující se a zanícenou pokožkou mohou přetrvávat. Pokud budete používat Sadu častěji, než byste měli, potíže se suchou, odlupující se a / nebo zanícenou kůží neustanou rychleji, naopak, pokožku můžete ještě více podráždit.

Upozornění

Není určeno pro děti mladší 3 let. Obsahuje kyselinu salicylovou. Zdravotnický prostředek nepřibližujte k očím. Nepoužívejte na poraněnou pokožku. Pokud se u Vás projeví podráždění pokožky, vyhledejte lékaře. Než vystavíte pokožku slunečnímu záření, na místa, kde jste přípravku použili, naneste krém s ochranným faktorem. U méně než 1 % pacientů se může vyskytnout folikulitida. Obsahuje stopové prvky těchto látek: citronelal, kumarin, farnesol, geraniol, limonen a linalol. Někteří pacienti mohou po aplikaci pociťovat mravenčení, pálení nebo svědění. Tyto pocity obvykle ustanou po cca 20 minutách, nepřetrvávají déle. Jestliže se reakce zhorší, připravte ihned smyjte vodou a mýdlem.

Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití přípravku vyhledejte pohotovostní lékařskou službu nejbližší nemocnice. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Po každém použití pečlivě uzavřete víčkem. Neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Uchovávejte při teplotě do 25 C, ale nezmrazujte.

Vzhled zdravotnického prostředku

SORATINEX DR. MICHAELS KRÉM 50G A 250G je krém světle béžové barvy, s charakteristickou vůní.

SORATINEX DR. MICHAELS GEL 200ML je hustá tekutina, průzračná až neprůhledná barvy, s charakteristickou vůní.

SORATINEX DR. MICHAELS OLEJ 200ML je tekutina světle žluto-hnědé barvy, s charakteristickou vůní.

Složení gelu: Alkohol, laurethsulfát sodný, kokamidopropyl betain, trietanolamin, TEA laurethsulfát, kyselina salicylová, karbomer, kyselina glykolová, kokamid DEA, kyselina citronová, tetrasodium EDTA, konzervační prostředek Plantaserv/Geogard, čistěná voda

Složení krém: Parafinový olej, parafinový vosk, lílek brambor, oxid zinečnatý, kyselina salicylová, mandlový olej, jojobový olej, avokádový olej, olej ze semenek mrkve, výtažek z měsíčku zahradního, pomerančový olej, olej z pšenických klíčků, meruňkový olej, levandulový olej, olej ze santalového dřeva, olej z pačuli, olej z pelargónie, rozmarýnový olej, emu olej, bergamotový olej, olej z pupalky dvouleté, eukalyptový olej, borovicový olej, heřmánkový olej, myrňový olej, neroli olej (olej z květů hořkého pomerančovníku)

Složení olej: Parafinový olej, parafinový vosk, olej z měsíčku lékařského, olej ze světlice barvířské, kastorový olej, olivový olej, sezamový olej, olej z pšenických klíčků, emu olej, levandulový olej, rozmarýnový olej, olej ze šípkové růže, olej z pupalky dvouleté, olej z citronové trávy

Výrobce:

V licenci společnosti Tirsell Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy., Frankston, VIC 3199, Austrálie

Vyrobeno v EU pro FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika společností Biotika

Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratinex.cz

Zdravotnický prostředek rizikové třídy I: Číslo certifikátu výrobce: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydáno společností URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnění 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.urs-certification.co.uk

EAN:

Soratinex velká sada: 8594163092573

Soratinex malá sada: 8594163097523

Soratinex střední sada: 8594163098216



25°C

5°C





Soratinex

Dr. Michaels Sada na lupénku

Soratinex Dr. Michaels Sada na lupénku

SK

príbalová informácia zdravotníckeho prostriedku

Čo by ste mali vedieť o SORATINEX DR. MICHAELS PSORIASIS KIT

Táto písomná informácia pre používateľov informuje používateľa o výhodách a možných rizikách užívania SORATINEX DR. MICHAELS PSORIASIS KIT. Túto písomnú informáciu pre používateľov uchovávajte spolu s obalom na neskoršiu kontrolu. Vždy si pozorne prečítajte informácie na použitie a vezmite na vedomie všetky upozornenia. SORATINEX DR. MICHAELS PSORIASIS PSORIASIS KIT používajte len dovtedy, kým nie je uvedená čas použiteľnosti každej súpravy produktov alebo dátum expirácie. Nikdy nezriedte finančné prostriedky ani ich nemiešajte s inými produktmi. Výrobok vždy aplikujte len čistými rukami alebo aplikátorom, ktorý sa pravidelne starostlivo umýva mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Ak používate aplikátory na aplikáciu výrobkov, uistite sa, že sa po použití vždy umyjú a nechajte ich pred ďalším použitím úplne vyschnúť. Nezdierajte zdravotnícku pomôcku s nikým iným.

Na čo sa používa SORATINEX DR. MICHAELS PSORIASIS KIT?

SORATINEX DR. MICHAELS PSORIASIS KIT sa používa na starostlivosť o suchú, odlupujúcu a zapálenú pokožku postihnutú psoriázou alebo atopickým ekzémom v pokožke hlavy a na tele u dospelých, na zmiernenie škálovania spôsobeného psoriázou. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča používať všetky produkty zahrnuté v súprave, tedy SORATINEX DR. MICHAELS CREAM 50G A 250G v kombinácii so zdravotníckym zariadením SORATINEX DR. MICHAELS GEL 200ml a SORATINEX DR. MICHAELS OIL 200ml, pretože sa navzájom dopĺňajú.

Použitie zdravotníckej pomôcky

SORATINEX DR. MICHAELS PSORIASIS MEDICAL DEVICE SÚPRAVA PSORIÁZY OBSAHUJE TRI doplnkové produkty, ktoré sa aplikujú v troch krokoch.

Po prvé, použite SORATINEX DR. MICHAELS GEL 200ml 1 krát denne, najlepšie ráno, nanesením na vlhkú pokožku, lathering špongiou alebo aplikátorom a opláchnutím teplou vodou po 2-3 minútach.

Potom naneste SORATINEX DR. MICHAELS CREAM 50g alebo 250g. Krém vždy naneste jemným masírovaním do pokožky a nechajte ho voľne absorbovať. Používajte krém dvakrát denne. Prvýkrát, najlepšie ráno po aplikácii gélu, a druhýkrát s časovým intervalom, najlepšie večer, už bez použitia gélu. Vždy po aplikácii krému ošetrte postihnutú oblasť SORATINEX DR. MICHAELS OIL 200 ml. Tým sa zabezpečí zachovanie aktívneho účinku krému na postihnutú pokožku. Vždy naneste olej jemným masírovaním do pokožky a nechajte ho absorbovať.

Skôr ako začnete používať zdravotnícku pomôcku

Skôr ako začnete používať SORATINEX DR. MICHAELS PSORIASIS PSORIASIS KIT, VŽDY najprv najprv vyskúšajte malé množstvo všetkých produktov na malej ploche kože pred použitím ako test možných reakcií, najmä ak používate produkty na citlivých oblastiach pokožky. Nechajte na koži 24-48 hodín pred umytím. Ak dôjde k akejkolvek reakcii, okamžite kontaktujte výrobcu. Ak nemáte žiadnu reakciu, aplikujte SORATINEX DR. MICHAELS SADA podľa návodu napoužitia.

Dodržiavajte odporúčanú frekvenciu používania:

AK používate SORATINEX DR. MICHAELS PSORIASIS PSORIASIS KIT menej často, ako by ste mali, je možné, že nebude mať také dobré účinky a problémy so suchou, odlupujúcou sa a zapálenou pokožkou môžu pretrvávajúť. Ak používate Súpravu častejšie, ako by ste mali, problémy so suchou, odlupujúcou sa a / alebo zapálenou pokožkou neustúpia rýchlejšie, naopak, môžete dráždiť pokožku ešte viac.

Oznámenie

Nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky. Obsahuje kyselinu salicylovú. Nepribližujte zdravotnícke zariadenie bližšie k očiam. Nepoužívajte na poranenú pokožku. Ak sa u Vás vyskytne podráždenie kože, navštívte lekára. Pred vystavením pokožky slnečnému žiareniu aplikujte opaľovací krém na miesta, kde ste výrobok použili. Menej ako 1% pacientov sa môže vyskytnúť folikulitída. Obsahuje stopové prvky takýchto látok: citrónelal, kumarín, farnesol, geraniol, limonén a linalol. U niektorých pacientov sa môže po aplikácii vyskytnúť brnenie, pálenie alebo svrbenie. Tieto pocity zvyčajne ustupujú asi po 20 minútach, netrvajú dlhšie. Ak sa reakcia zhorší, okamžite zmyte vodou a mydlom.

Bezpečnosť a skladovanie

Uchovávajú mimo dosahu detí. Ak je výrobok požitý, vyhľadajte pohotovostnú lekársku pomoc z najbližšej nemocnice. Neindukuje zvracanie. Po každom použití opatrne zatvorte vekom. Neuchovávajú na priamom slnečnom svetle ani v blízkosti zdrojov tepla. Neuchovávajú pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, ale nemrzňte.

Vzhľad zdravotníckej pomôcky

SORATINEX DR. MICHAELS CREAM 50G A 250G je krém svetlej béžovej farby s charakteristickou vôňou.

SORATINEX DR. MICHAELS GEL 200ML je hustá kvapalina, číra až nepriehľadná farba, s charakteristickou vôňou.

SORATINEX DR. MICHAELS OIL 200ML je kvapalina svetložltého farby s charakteristickou vôňou.

Zloženie gélu: Alkohol, síran laureth sodný, cocamidopropyl betaín, trietanolamín, TEA laureth sulfát, kyselina salicylová, karbomer, kyselina glykolová, cocamid DEA, kyselina citrónová, tetrasod EDTA, konzervačná látka Plantaserv/Geogard, čistená voda.

Zloženie krému: Parafínový olej, parafínový vosk, zemiakový baklažán, oxid zinočnatý, kyselina salicylová, mandľový olej, jojobový olej, avokádový olej, olej z mrkvových semien, záhradný extrakt z nechtíka, pomarančový olej, olej z pšeničných klíčkov, marhuľový olej, levanduľový olej, santalový olej, olej zo santalového dreva, pápanie olej, pažerákový olej, olej z pažeráka, marhuľový olej, levanduľový olej, santalový olej, pažerákový olej, olej zo santalového dreva, pačuli olej, pelargónie olej, eukalyptový olej, borovicový olej, harmančekový olej, myrňový olej, neroli olej (horký olej z pomarančového kvetu)

Zloženie oleja: parafínový olej, parafínový vosk, nechtíkový olej, svetlicový olej, ricínový olej, olivový olej, sezamový olej, olej z pšeničných klíčkov, emu olej, levanduľový olej, rozmarínový olej, šípkový olej, večerný prvosenkový olej, lemongrass olej.

Výrobca:

Na základe licencie od Tisrel Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrália

Vyrobené v EÚ pre FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika by Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, e-mail: info@soratinex.cz

Zdravotnícka pomôcka rizikovej triedy 1: Číslo certifikátu výrobcu: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydané spoločnosťou URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, ukas členské schvaľovacie číslo 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.urs-certification.co.uk

Soratinex veľká sada: 8594163092573

EAN: Soratinex malá sada: 8594163097523

Soratinex stredná sada: 8594163098216

